

幅広く害虫を防除

アザミウマ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類、キスジノミハムシ、チョウ目害虫に高い効果を示します。

10～14日間の持続効果

10～14日間の長期残効性で作物を健全に生育させ、より高い品質と収量が期待できます。

天敵・訪花昆虫に対する高い安全性

ハチ類の導入も制限が少なく、IPMプログラムに高い適合性があります。

■適用害虫と使用方法

2015年6月24日現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	10アール当り使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ、ウババエ類、オオタバコガ	2000～4000	100～300ℓ	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000					
はくさい	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	2000～4000					
	アブラムシ類	2000					
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ	2000～4000					
	ヨトウムシ アブラムシ類、ハモグリバエ類、キスジノミハムシ	4000 2000					
ブロッコリー	アオムシ、ハスモンヨトウ、コナガ	2000～4000					
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000					
トマト	オオタバコガ	2000～4000					
	ハモグリバエ類、コナジラミ類、アブラムシ類	2000					
きゅうり	アブラムシ類、コナジラミ類、ウリノメイガ	2000					
レタス	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	2000～4000					
	ナモグリバエ、アブラムシ類	2000					
いちご	ハスモンヨトウ	2000～4000					
	アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類	2000					
えだまめ	アブラムシ類	2000～4000					
	ハスモンヨトウ、マメシクイガ						
だいず	アブラムシ類	2000	収穫7日前まで				
ねぎ	シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	2000	収穫前日まで				
	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ	4000	収穫7日前まで				
かんしょ	ハスモンヨトウ	2000	収穫前日まで				
	アブラムシ類						
ばれいしょ	ハスモンヨトウ	4000	収穫前日まで				
	アブラムシ類						
かぼちゃ	ハスモンヨトウ	4000	収穫10日前まで				
	ヨトウムシ						

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 散布液調整後はできるだけ速やかに散布してください。
- アルカリ性の農薬や肥料との混用は避けてください。
- やむを得ず、他の薬剤と混用する場合には、事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。特に、TPNを含む農薬、ストロビルリン系の薬剤を含む農薬および銅剤との混用は薬害を生じるおそれがあるので、混用はしないでください。
- トマトに使用する場合、ストロビルリン系薬剤を含む農薬を散布した場合には、散布後2週間以上間隔を空けて本剤を使用してください(薬害)。
- 本剤は展着剤を加用すると薬害を生じる場合があるので、展着剤を加用しないでください。
- 使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節してください。
- 過度の連用を避け、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせ使用してください。

- つまみ菜・間引き菜には使用しないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用の場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔

- などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするのととも衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響を与えるおそれがあるので、散布の際はミツバチ及び巣箱にかからないようにしてください。また、散布直後から1日後まではミツバチを散布区域外に移動させるか、巣門を閉じてください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光を避け、なるべく低温場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。●防除日誌を記載しましょう。

*本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載以外には使用しないでください。

*本印刷物は2015年7月現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

BNV1N1A

篠原商店でご購入される場合は
このページををクリック!



三井化学アグロ株式会社
東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>

確かな防除で、納得の作物づくりへ。
食べる人の喜びこそ、すべて。

- 新規作用性で広範囲の害虫を防除。
- 10～14日間の長期残効で、作物の健全な生育をサポート。
- 天敵・訪花昆虫に対する高い安全性でIPMプログラムにも適応。

野菜散布用殺虫剤

デュポン™

ベネビア® OD

powered by
CYAZYPYR®



ネギの害虫対策に
収穫前日まで使用できます。
ネギアザミウマにお困りの方に
お勧めです。