

ダイラーグ[®]

粒剤

アセタミプリド粒剤1.5kg入

有効成分：アセタミプリド……………1.0%
人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

特長

- 1 処理が簡単。株元に散布するだけ。
- 2 アブラムシ類、グンバイムシ類に高い効果。
- 3 長期間効果が持続。
- 4 ミツバチに影響が少ない。
- 5 臭いが少ない。



2017年9月13日付で「カイガラムシ類」が適用登録されました。
作物名「クロトン」適用害虫「カイガラムシ類」使用量「30kg/10a」

適用害虫の範囲および使用方法

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセタミプリドを含む農薬の総使用回数
つつじ類	グンバイムシ類	6~12kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内 (樹幹注入は1回以内)
	アブラムシ類	12kg/10a				
しきみ	グンバイムシ類	12~30kg/10a				
樹木類 (つつじ類・しきみを除く)	アブラムシ類	12~30kg/10a				
花き類・観葉植物		1g/株				5回以内

効果薬害等の注意

- (1) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- (2) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にかからないようにしてください。
- (3) 花き類・観葉植物に使用する場合、幼苗期の使用では薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- (4) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

使用上の注意

- (1) 本剤の中毒に対しては、動物実験でL-メチオニン製剤、グリチルリチン製剤及びグルタチオン製剤の注射投与が有効であるとする報告もあります。
- (2) 散布の際は農薬用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをしてください。
- (3) 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管

直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

包装：1.5kg×12袋入り

販売元



TAISHIN SANGYO CO., LTD.
大信産業株式会社

本社 〒722-8507 広島県尾道市美ノ郷町本郷1番地180
TEL.0848-38-2612 FAX.0848-38-2613

お求め・お問い合わせは

ミミシの類、松竹の類、
の井川、蜘蛛の類

圃木、樹木、
の田の類

グンバイムシ、アブラムシに、
効き目の一球。



アセタミプリド粒剤 1.5kg入

しきみ



TAISHIN SANGYO CO.,LTD.
大信産業株式会社