


殺虫剤

フェニックス®

顆粒水和剤

®は日本農業(株)の登録商標



効き目が長いから「安心」!!



果樹・野菜のチョウ目害虫防除に!



写真はイメージです

適用拡大!!

適用病害虫および使用方法

〈2014年3月現在の登録内容〉

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フルベンジアミドを含む 農薬の総使用回数	
かんきつ	ミカンハモグリガ、ハマキムシ類、ケムシ類、アゲハ類	4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
もも、ネクタリン	ハマキムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、ケムシ類						3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)	
おうとう	ハマキムシ類						2回以内	
すもも	シンクイムシ類、ケムシ類							
なし	ハマキムシ類、シンクイムシ類、ケムシ類							
りんご	ハマキムシ類	4000～6000倍		収穫14日前まで	3回以内		2回以内	
ぶどう	ギンモンハモグリガ、キンモンホソガ、ヨモギエダシャク、シンクイムシ類、ケムシ類	4000倍					収穫7日前まで	3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)
かき	ハスモンヨトウ、ハマキムシ類、ケムシ類							3回以内
キウイフルーツ	カキノヘタムシガ、イラガ類							2回以内
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	ハマキムシ類							3回以内
うめ	ケムシ類		2回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)					
キャベツ	ヨトウムシ、オオタバコガ、アオムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ウワバ類	2000～4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)		
はくさい	オオタバコガ	2000倍				2回以内		
ブロッコリー	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	2000～4000倍						
レタス	ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、コナガ、ハスモンヨトウ	2000倍						
非結球レタス	ウワバ類、ヨトウムシ	2000～4000倍						
なばな類、 非結球あぶらな科葉菜類	ウワバ類、ヨトウムシ	2000倍		2回以内				
かぶ	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	2000～4000倍			2回以内			
カリフラワー	ウワバ類、ヨトウムシ	2000倍						
ねぎ	ハイマダラノメイガ	2000～4000倍						
だいこん	ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ	2000倍						
はつかだいこん	コナガ	2000～4000倍						
	シロイチモジヨトウ、ネギコガ	2000～4000倍	収穫7日前まで	3回以内	3回以内			
	ハイマダラノメイガ、コナガ	2000～4000倍		2回以内	2回以内			
				1回	1回			

2014年3月適用拡大

→裏面につづく

適用病害虫および使用方法

〈2014年3月現在の登録内容〉

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルベンジアミドを含む農薬の総使用回数
きゅうり	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ウリノメイガ	2000～4000倍					
すいか	ハスモンヨトウ	2000倍			2回以内		2回以内
	ウリノメイガ、オオタバコガ	2000～4000倍			3回以内		3回以内
なす	2回以内				2回以内		
トマト、ミニトマト、いちご							
ピーマン							
ばれいしょ							
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ				2000～6000倍		3回以内
さといも	2000～4000倍						
はすいも（葉柄）	2000倍						
食用金魚草	ハスモンヨトウ	4000倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
しそ（花穂）		収穫3日前まで					
しそ		2000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
みょうが（花穂）				収穫前日まで			
みょうが（茎葉）				*			
アスパラガス		ハスモンヨトウ、オオタバコガ		2000～4000倍	収穫前日まで		2回以内
えだまめ	ヨトウムシ	3回以内					3回以内
だいず	ハスモンヨトウ、マメシクイガ	2000倍		収穫7日前まで			
とうがらし類	オオタバコガ	2000～4000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
豆類（未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く）	ハスモンヨトウ	2000倍					
さやいんげん		2000～4000倍					
さやえんどう	シロイチモジヨトウ	2000倍					
にんじん	ヨトウムシ	2000～4000倍					
オクラ	ハスモンヨトウ	2000倍					
しょうが							
メロン	ウリノメイガ						
にがうり	ハスモンヨトウ				2回以内		2回以内
メキャベツ	アオムシ、ウワバ類、コナガ						
しよくようほおずき	ハスモンヨトウ						
わさびだいこん	コナガ		収穫7日前まで		2回以内	2回以内	
やまのいも	ナガイモコガ	2000～4000倍	収穫前日まで				
	ハスモンヨトウ	2000倍	収穫14日前まで				
やまのいも（むかご）	ナガイモコガ	2000～4000倍					
あずき	ヨトウムシ	2000～6000倍		収穫7日前まで			
とうもろこし、ヤングコーン	アワノメイガ	2000～4000倍	収穫前日まで	4回以内			4回以内
	オオタバコガ	2000倍	収穫7日前まで				
そば	ハスモンヨトウ	2000～6000倍					
茶	チャノコカクモンハマキ、チャノホソガ、チャハマキ、ヨモギエダシヤク、ハスモンヨトウ	2000倍	200～400ℓ/10a	摘採7日前まで	1回	1回	
花き類・観葉植物（きくを除く）	オオタバコガ、ハスモンヨトウ		100～300ℓ/10a	発生初期	4回以内	4回以内	
さく	オオタバコガ						
	ハスモンヨトウ	2000～4000倍					

2014年3月適用拡大

*みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで

！注意事項

●植物体への浸透移行性による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。●ぶどうの幼果期から果粒肥大期に使用する場合、果粉の溶脱が生じるおそれがあるので注意してください。●西洋なしの品種ル レクチエでは落花後から袋かけ前までの散布についてはリング状の葉斑が生じるおそれがあるので使用をさけてください。●室に対しては長期間毒性があるので、農薬には絶対にかからないように散布してください。●適用作物群に属する作物又はその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。●眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の担当を受けてください。また、使用後は洗眼してください。●水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう十分注意して使用してください。●散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所に置かないでください。
- 使用後の空袋・空容器等は園場などに放置せず、適切に処理してください。



日本農薬株式会社

東京都中央区京橋1丁目19番8号

ホームページアドレス <http://www.nichino.co.jp/>

2014年3月作成版(SPA) 50M 0214056(1403)