

有効成分：ピラクロニル…4.0% フルセトスルフロン…0.40% メントリオン…1.8%

人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指すという通称)

## 適用雑草と使用方法


※本内容は平成28年1月20日付けの登録内容に基づいています。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後5日～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで	小包装 (パック) 10個(500g) /10a	1回	水田に小包装(パック) のまま投げ入れる

\*各有効成分を含む農薬の総使用回数：ピラクロニル…2回以内、フルセトスルフロン…2回以内、メントリオン…2回以内

## 上手な使い方

※地域、作型、気象条件、前処理剤の使用時期や残効期間により、雑草の発生状況は異なります。



## 使用のポイント



### 代かき

田面が均一になるように、ていねいに代かきをしてください。



### 湛水深

散布時は水の出入りを止めて、5～6cmの水深にしてください。



### 浮遊物

藻類・表層はく離などの浮遊物が多い条件下では、拡散が不十分となり部分的な効果不足や薬害が生じることがあるので、使用をさけてください。



### 水管理

散布後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態(3～5cm)を保ち、田面を露出させないようにしてください。また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。



砂質土壌の水田や極端な漏水田(減水深2cm/日以上)では使用しないでください。



軟弱苗を移植したとき、苗の活着が不十分なきや、極端な浅植えの水田、および浮き苗の多い水田では使用しないでください。

梅雨期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は除草効果が低下することがあるので使用をさけてください。

## △ 効果・薬害等の注意

- 本剤は小包装(パック)のまま10アール当たり10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。
- ノビエの3.5葉期までに、時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にブレがあるので、必ず適期に散布してください。
- 稲の根が露出する条件では薬害が発生するおそれがあるので、使用をさけてください。
- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、ぬれた手で作業したり、降雨で破袋することがないように注意してください。

- 散布後数日間暑い高温が続く場合、初期生育が抑制されることがありますが、一過性のもので次第に回復し、その後の生育に対する影響は認められていません。
- 本剤はその殺草特性からいぐさ、れんこん、せり、くわい等の生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合には、十分注意してください。
- 散布後の水田水を他の作物に灌水しないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

● 使用前にはラベルをよく読む。 ● ラベルの記載以外には使用しない。 ● 小児の手の届く所には置かない。

空袋は圃場などに放置せず適切に処理する。

ISK 石原バイオサイエンス株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目4番14号

ホームページアドレス <http://ibj.iskweb.co.jp>

取扱い

篠原商店でご購入される場合はこのページをクリック

水稲用初・中期一発除草剤

農林水産省登録  
第23767号

# フルパワー<sup>®</sup>MX

## ジャンボ

ピラクロニル・フルセトスルフロシメソトリオン粒剤



# パワー炸裂!!

- 1 3.5葉期までのノビエにすぐれた効果
- 2 高葉令の広葉雑草にも効果
- 3 SU抵抗性雑草にも有効
- 4 ゆとりある散布適期

