

速く効く。あの害虫にも効く。

グレーシア<sup>®</sup>  
乳剤

農林水産省登録 第24185号 有効成分 フルキサメタミド…10.0% 人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指す） 容量：250ml入、500ml入

グレーシアは、「効きの速さ」と  
「対象害虫の幅広さ」を兼ね備えた  
新規殺虫剤です。

POINT

01

効きの速さ

有効成分が直接害虫に作用するから、  
作物が食べられる前\*に駆除できる。

\*グレーシアの速効性については、右の試験写真をご覧ください。

■速く効くから、収量に差がつきます。



2018年 日産化学生物科学研究所(社内試験)【試験方法】虫体浸漬、処理1時間後餌入り、20時間後撮影

POINT

02

対象害虫の幅広さ

チョウ目害虫やアザミウマなど幅広い害虫\*に卓効。

\*作物によって適用害虫は異なります。詳しくは下の表をご覧下さい。

## 適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量 (/10a)	使用時期	総使用回数*	使用方法
さといも	ハスモンヨトウ					
かんしょ	ナカジロシタバ					
だいこん	コナガ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ、キスジノミハムシ					
はくさい	ハスモンヨトウ					
キャベツ	コナガ、アオムシ、ウワバ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ネギアザミウマ	2000~3000倍	100~300L	収穫7日前まで		
カリフラワー	コナガ、アオムシ					
ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ					
レタス、非結球レタス	ナモグリバエ			収穫3日前まで		
たまねぎ	ネギアザミウマ				収穫7日前まで	
ねぎ	ネギコガ、ネギハモグリバエ、ネギアザミウマ					
トマト、ミニトマト	ハスモンヨトウ、コナジラミ類、トマトハモグリバエ					
ピーマン	オオタバコガ					
なす	コナジラミ類、アザミウマ類、ハダニ類、チャノホコリダニ					
きゅうり	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、トマトハモグリバエ、ハダニ類	2000倍		収穫前日まで		
すいか	アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類					
メロン	アザミウマ類、コナジラミ類、ウリノメイガ、ハダニ類					
だいす	マシエンクイガ、ハスモンヨトウ					
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやえんどうを除く)	ハスモンヨトウ	2000~3000倍		収穫14日前まで		
さやえんどう	ハスモンヨトウ、ナモグリバエ					
えだまめ	マシエンクイガ、ハスモンヨトウ			収穫前日まで		
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ハダニ類					
茶	チャノコカクモンハマキ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ、チャトガコナジラミ	2000倍	200~400L	摘採14日前まで	1回	
きく	サビダニ類、チャノホコリダニ	2000~3000倍				
	ハスモンヨトウ、ナミハダニ	2000倍	100~300L	発生初期	2回以内	

\*本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

### 使用上の注意事項(抜粋)

●天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。●水なし、賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2019年1月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号

ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>

お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)

速く効く。  
だから、  
あの害虫にも効く。  
収量に差がつく。<sup>\*2</sup>

大切な作物の食害を抑え、収量を確保したい。  
決め手は「効きの速さ」と「対象害虫の幅広さ」。  
食べられる前に害虫を駆除、新規殺虫剤 グレーシア。

新発売

野菜・  
茶用殺虫剤

# グレーシア<sup>®</sup>乳剤



- 新規有効成分フルキサメタミド配合。抵抗性コナガにも卓効
- 葉内に薬剤が浸透、葉裏の害虫も退治
- 幅広いチョウ目害虫に効果
- 殺虫効果は約2週間持続

\*1 作物によって適用害虫は異なります。詳しくは裏面をご覧下さい。  
\*2 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。



N 日産化学株式会社