

殺菌剤

パレード20フロアブル

有効成分：ピラジフルミド…20.0%

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

特長

■新しい有効成分「ピラジフルミド」を配合した野菜用SDHI殺菌剤

「ピラジフルミド」はSDHI殺菌剤の中で唯一ピラジンカルボキサミド骨格を持ち、優れた防除効果と高い作物安全性を示します。

■野菜の幅広い病害に高い効果を発揮

菌核病、うどんこ病、灰色かび病などの幅広い病害に高い効果を示し、浸透性・移行性があり、治療・予防・耐雨・残効性に優れます。

■適用作物に対する安全性が極めて高い

適用作物に対する安全性が極めて高く、これまでの試験では適用作物への薬害発生事例はありません。

適用病害虫および使用方法

2018年3月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む 農薬の総使用回数
あずき いんげんまめ 豆類（未成熟）	菌核病、灰色かび病	2000～ 4000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
トマト ミニトマト	灰色かび病、葉かび病 うどんこ病						
なす	灰色かび病、すすかび病	2000倍					
	菌核病、うどんこ病	2000～ 4000倍					
きゅうり	灰色かび病、菌核病 うどんこ病、褐斑病						
にがうり	うどんこ病	2000倍					
すいか	菌核病、うどんこ病	2000～ 4000倍					
メロン	つる枯病、うどんこ病						
はくさい	黒斑病、白斑病						
キャベツ	菌核病、株腐病						
ブロッコリー	菌核病						
レタス 非結球レタス	菌核病、灰色かび病 すそ枯病						
たまねぎ	灰色かび病、灰色腐敗病						
ねぎ	黒斑病、葉枯病						
	さび病						
いちご	うどんこ病、灰色かび病			2000～ 4000倍			
ピーマン	うどんこ病						
きく	白さび病	4000倍					
	うどんこ病						
ばら	うどんこ病、黒星病						
花き類・観葉植物 （ばら、きくを除く）	うどんこ病		発病初期				



注意事項

- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましく、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

篠原商店でご購入される場合は
このページをクリック！



日本農薬株式会社

東京都中央区京橋1丁目19番8号

カスタマーサービス TEL. 03-6361-1414

ホームページアドレス <http://www.nichino.co.jp/>

2018年3月作成版(TS)EX11803S

明日の
農業を
考える

豊かな収穫へ行進!!

新登場

殺菌剤

パレード20
フロアブル



幅広い病害に高い効果を発揮!!
適用作物への薬害リスクが極めて低い!




あすき／菌核病



なす／うどんこ病



レタス／菌核病



たまねぎ／灰色腐敗病



ねぎ／葉枯病



いちご／灰色かび病