

べと病、疫病、白さび病を ピシッとロック!

殺菌剤

ピシロック[®]
フロアブル

有効成分:ピカルブトラゾクス 5.0%

人畜毒性:普通物

(毒劇物に該当しないものを指す通称)



特長

- べと病、疫病等、卵菌類由来の病害に対して高い効力を示します。
- 新規骨格のテトラゾリルオキシム系殺菌剤で新規作用機構(推定)です。
- 既存の殺菌剤耐性菌に対しても有効ですので、ローテーション散布の1剤として期待できます。
- 予防効果が主体の殺菌剤です。浸透活性があります。
- 収穫前日まで(はくさいは収穫3日前まで)使用できます。

上手な使い方

発病前~発病初期に使用するとより高い効果が期待できます。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピカルブトラゾクスを含む農薬の総使用回数
だいこん	白さび病 ワッカ症				2回以内		2回以内
ブロッコリー ほうれんそう							
きゅうり メロン キャベツ レタス 非結球レタス たまねぎ	べと病	1000倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
ミニトマト	疫病						
すいか	褐色腐敗病						
はくさい	べと病			収穫3日前まで			

!
効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 敷設量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合せて調整してください。
- 過度の連用を避け、なるべく作用機構の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 本剤を使用しただいこんは、つまみ菜、間引き菜として食用に供さないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

FRACコード	殺菌剤グループ名
U17	テトラゾリルオキシム

・ピシロック[®]のFRACコードはU17です。
・U17に分類される殺菌剤は他に無く、殺菌剤のローテーションにおすすめです。

!
安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激があるので眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗してください。

保管:密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に保管してください。

包装:500ml×20本

殺菌剤耐性菌対策

殺菌剤の耐性菌の発生を抑制するために、FRACコードの異なる薬剤による体系防除をおすすめします。

FRACおよびFRACコードは下記のURL (FRAC日本支部) をご参照ください。

Fungicide Resistance Action Committee(FRAC)
<https://www.jfrac.com/>

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
● 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

本資料は2017年7月現在の登録内容に基づいています。



日本曹達株式会社

本社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号
TEL.03-3245-6178 FAX03-3245-6084
ホームページアドレス <http://www.nippon-soda.co.jp/nouryo/>
大阪支店 ☎(06) 6229-7343 関東営業所 ☎(048) 677-6010
札幌営業所 ☎(011) 241-5581 名古屋営業所 ☎(052) 238-0003
仙台営業所 ☎(022) 227-1741 福岡営業所 ☎(092) 771-1336
信越営業所 ☎(0255) 81-2323 松山営業所 ☎(089) 931-7315

篠原商店でご購入される場合は
このページをクリック!

べと病、疫病、白さび病を
ピシっとロック!!



殺菌剤

ピコロツク[®] フルアブル

ピカルブトラゾクス水和剤



日本曹達株式会社