

## ゼータタイガー1キロ粒剤の適用と使用方法

農林水産省登録 第23748号

[有効成分] プロピリスルフロン…0.9%  
プロモブチド…9.0% ベントキサゾン…2.0%

■主要雑草に対する使用適期

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ ミスガヤツリ	3葉期まで
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミスガヤツリ ウリカワ クログワイ ヒルムシロ セリ	移植時	1kg/10a	1回	田植同時 散布機で施用	ヒルムシロ	発生期まで
		移植直後～ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで			湛水散布		セリ
						クログワイ	発生始期まで

## ゼータタイガーフロアブルの適用と使用方法

農林水産省登録 第23735号

[有効成分] プロピリスルフロン…1.7%  
プロモブチド…16.6% ベントキサゾン…3.7%

■主要雑草に対する使用適期

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ	3葉期まで
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミスガヤツリ ウリカワ クログワイ ヒルムシロ セリ	移植後3日～ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	500mℓ/10a	1回	原液湛水散布	ミスガヤツリ	4葉期まで
							ヒルムシロ
						セリ	再生前から再生始期まで
						クログワイ	発生始期まで

## ゼータタイガージャンボの適用と使用方法

農林水産省登録 第23749号

[有効成分] プロピリスルフロン…3.0%  
プロモブチド…30.0% ベントキサゾン…6.67%

■主要雑草に対する使用適期

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ	3葉期まで
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミスガヤツリ ウリカワ クログワイ ヒルムシロ セリ	移植後3日～ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装(パック) 10個 (300g)/10a	1回	水田に 小包装(パック)の まま投げ入れる	ミスガヤツリ	4葉期まで
							ヒルムシロ
						セリ	再生前から再生始期まで
						クログワイ	発生始期まで

プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数 2回以内

プロモブチドを含む農薬の総使用回数 2回以内

ベントキサゾンを含む農薬の総使用回数 2回以内

(上記の内容はすべて2015年11月25日現在の登録内容)

### 使用上の注意事項

#### 【3剤共通の使用上の注意事項】

- 雑草の発生前から生育初期に有効なため、ノビエの3葉期までに、時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにしてください。
- 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
  - ①砂質土壌の水田及び漏水の大きな水田(減水深が2cm/日以上)。
  - ②軟弱な苗を移植した水田。
  - ③極端な浅植えの水田。
- クログワイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないため、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用してください。
- 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の湛水に用いないでください。
- その殺草特性から、いくさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用するには十分に注意してください。
- いくさ栽培予定水田では使用しないでください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は異常気象の場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 散布後は水管理に注意してください。

#### 【1キロ粒剤・フロアブルの使用上の注意事項】

- 散布の際は、水の出入りを止めて湛水状態(水深3～5cm)で、まきむらが生じないように均一に散布してください。また、極端な浅水や深水での使用はさけてください。
- 散布後3～4日間はそのまま湛水を保ち、田面を露出させないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、入水は静かにおこなってください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいにおこなってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいにおこなってください。
- 田植前に生育したミスガヤツリは、完全に防除してから使用してください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養魚池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。

#### 【1キロ粒剤・ジャンボの使用上の注意事項】

- 著しい多雨条件では除草効果が低下する場合がありますので使用はさけてください。
- 【フロアブルの使用上の注意事項】
  - 使用前に容器を軽く振ってください。
  - 著しい多雨条件では除草効果が低下する場合がありますので使用はさしひかえてください。
  - 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 【ジャンボの使用上の注意事項】
  - 藻類または表層はく離の発生しやすい水田では、有効な剤との組み合わせで使用してください。
  - 苗の植え付けが均一になるように整地、代かきはていねいに行い、ワラクなどの浮遊物はできるだけ取り除いてください。また、未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行ってください。
  - 処理に当たっては、水の出入りを止めて5～6cmの湛水状態に保ってください。処理後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないようにし、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。自然減水により田面の一部が露出するようになったら、水尻を止めて通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じてください。
  - 小包装(パック)のまま、10アール当たり10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。
  - 藻や浮き草が多発している水田では拡散が不十分となり、部分的な薬害や効果不足の可能性があるので使用をさけてください。
  - パックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で作業したり、降雨で破袋することがないように注意してください。
  - 移植前に生育したミスガヤツリには効果が劣るので、物理的防除方法などを用いて移植前に防除してから使用してください。
  - 濡れた手で触らないでください。
  - 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。
    - ①眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の指導を受けてください。
    - ②かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
  - 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養魚池等に流入しないよう注意して使用してください。
  - 空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋、空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

27H12L15Z19:ZS

2015年12月作成 (全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ  
SCC GROUP

住友化学

住友化学株式会社

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト i-農力 <http://www.i-nouryoku.com>

新登場

水稲用初・中期一発処理除草剤

# ゼータタイガー®

1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ



Sokojikara  
クログワイに底力!!

本剤は(公財)日本植物調節剤研究協会での  
A-1S区分: 難防除雑草一発処理(クログワイ)で  
判定を取得しています。

雑草、一撃。

プロピリスルフロ  
ン  
プロモフチ  
ド  
ベントキサゾン

3成分



- ◆ 3成分の一発処理除草剤
- ◆ 高葉齢のノビエ(3葉期)を始め  
SU抵抗性雑草に優れた効果
- ◆ 多年生難防除雑草クログワイに  
高い効果



処理区



無処理区

クログワイへの除草効果(処理39日後)

2015年 住友化学(株)社内試験 ※写真は1キロ粒剤によるものです。



ノビエ



ホタルイ



コナギ



アセナ